

SURAT KETERANGAN

Nomor: 490/UNUSA/Adm-LPPM/VI/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada tanggal 20 Mei 2020.

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian
Anemia Pada Ibu Hamil Tm Iii Di Bpm Kusmawati Surabaya

Penulis : Siska Nurul Abidah, Yasi Anggasari

No. Pemeriksaan : 2020.06.05.231

Dengan Hasil sebagai Berikut:

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) yaitu 23%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 05 Juni 2020

Ketua LPPM,




Dr. Istas Pratomo, S.T., M.T.

NPP. 16081074

LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Website : lppm.unusa.ac.id

Email : lppm@unusa.ac.id

Hotline : 0838.5706.3867

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TM III DI BPM KUSMAWATI SURABAYA

by Siska Nurul Abidah Yasi Anggasari

Submission date: 20-May-2019 08:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 1133019787

File name: siska_nurul_abidah_revisi_3.doc (107K)

Word count: 3328

Character count: 19719

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TM III DI BPM KUSMAWATI SURABAYA

Siska Nurul Abidah, Yasi Anggasari

Fakultas Keperawatan dan Kebidanan
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Jl. Smea Surabaya
Email : siskanurul@unusa.ac.id, yasi@unusa.ac.id

ABSTRACT: Anemia in pregnancy is still a chronic problem in Indonesia as evidenced in the prevalence of pregnant women reaching 63.5%. In the last four years the prevalence of anemia did not show a significant decline. Anemia in pregnancy can adversely affect especially during pregnancy, labor and childbirth. This study aims to analyze the factors associated with the incidence of anemia in pregnant women TM III. This study uses a quantitative design with a cross sectional research design. Population and sample were TM III pregnant women who examined at BPM Kusmawati Surabaya for 3 months. Samples were taken using a total sampling of 45 respondents. Data collection uses primary data in the form of questionnaires and secondary data in the form of PWS KIA register book, then the data is analyzed using Chi-Square statistical test. The statistical test results showed that there was no significant relationship between the age of the mother and the incidence of anemia ($p = 0.358$), there was a significant correlation between nutritional status and the incidence of anemia ($p = 0.000$), there was no significant relationship between parity and anemia ($p = 0.222$), there was a significant relationship between antenatal care frequency and the incidence of anemia ($p = 0.000$), there was a significant relationship between the level of knowledge and the incidence of anemia ($p = 0.034$) and there was a significant relationship between adherence to Fe tablet consumption and incidence of anemia ($p = 0.024$). Factors related to the incidence of anemia in pregnant women TM III at BPM Kusmawati were nutritional status factors, frequency of antenatal care, level of knowledge and compliance with consumption of Fe tablets. It is hoped that health workers will continue to improve counseling and counseling for pregnant women to prevent anemia.

Keywords: Anemia, Pregnant Women

ABSTRAK : Kejadian anemia pada saat kehamilan dapat memberikan pengaruh buruk terutama saat kehamilan, persalinan dan nifas. Hal ini masih menjadi masalah utama di Indonesia, terhitung dalam empat tahun terakhir prevalensi anemia tidak menunjukkan penurunan yaitu masih mencapai presentase 63,5%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III.

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Populasi dan Sampel adalah ibu hamil TM III yang diperiksa di BPM Kusmawati Surabaya selama 3 bulan. Sampel diambil menggunakan total sampling sebesar 45 responden. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuesioner dan data sekunder berupa buku register PWS KIA, kemudian data dianalisis menggunakan uji statistik *Chi-Square*.

Hasil uji statistik, didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara umur ibu dengan angka kejadian anemia pada ibu hamil TM III ($p = 0,358$), ada hubungan signifikan antara status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III ($p = 0,000$), tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah paritas dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III ($p =$

0,222), ada hubungan yang signifikan antara jumlah pemeriksaan kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III ($p = 0,000$), ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan angka kejadian anemia ($p=0,034$) dan ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe dengan tingkat kejadian anemia ($p=0,024$).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III di BPM Kusmawati adalah faktor status gizi, jumlah pemeriksaan kehamilan, tingkat pengetahuan dan kepatuhan konsumsi tablet Fe. Diharapkan bagi petugas kesehatan agar terus meningkatkan penyuluhan dan konseling bagi ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia

Kata kunci: Anemia, Ibu Hamil

PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator ketidakberhasilan dalam memberi pelayanan kesehatan di suatu negara. Penderita anemia pada ibu hamil lebih banyak terjadi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju.. Kematian ibu dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya karena anemia (Amiruddin, 2007).. Di Amerika hanya sekitar 6% ibu hamil yang menderita anemia, sedangkan di Indonesia relatif tinggi yaitu 63,5%. Sebagian besar disebabkan karena kurangnya zat gizi dan perhatian terhadap ibu hamil sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia defisiensi zat besi (Saifuddin A.B, 2007).

Menurut WHO 4% kematian ibu di negara yang sedang berkembang berkaitan dengan anemia, dalam kehamilan kebanyakan anemia disebabkan oleh defisiensi zat besi dan perdarahan akut, bahkan tidak jarang keduanya berinteraksi (Sarwono, 2009). Menurut WHO, kejadian anemia kehamilan berkisar antara 20% sampai 89% dengan menetapkan Hb 11g% (g/dl) sebagai dasarnya. Angka kejadian anemia di Indonesia menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Hoo Swie Tjong menemukan angka anemia kehamilan sebesar 3,8% pada trimester I, 13,6% pada trimester II dan 24,8% pada trimester III (Manuaba, 2012).

Di Indonesia anemia masih merupakan salah satu dari empat masalah gizi utama, disamping kurang kalori,protein, defisiensi vitamin A dan gondok endemik. Kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi zat besi dan pendarahan akut bahkan tidak jarang keduanya saling berinteraksi. (Sarwono, 2009)

WHO menyatakan kejadian anemia berkisar antara 20% sampai 89% dengan menetapkan HB normalnya 11 gr%. Selain itu di daerah pedesaan banyak di jumpai ibu hamil kekurangan gizi, kehamilan dan persalinan dengan jarak yang berdekatan, dan ibu hamil dengan pendidikan dan tingkat sosial ekonomi rendah (Manuaba, 2012).

Penyebab kematian dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Kematian ibu langsung yaitu perdarahan (24,72%), eklamsi (30,90%), jantung (10,86%), sepsis (4,87%), dan penyebab lain sebesar (28,65%). Sedangkan penyebab tidak langsung yang mendasar adalah faktor lingkungan, perilaku, genetik dan pelayanan kesehatan sendiri, salah satunya adalah 53% ibu hamil menderita anemia, 4 terlalu (hamil atau bersalin terlalu muda dan tua umurnya, terlalu banyak anak dan terlalu dekat jarak kehamilan / persalinannya). (Dinkes, 2016)

Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan november 2018 dengan observasi dan wawancara dari 10 ibu hamil yang dilakukan wawancara 6 orang ibu belum mengetahui bahaya kehamilan dengan anemia dan berdasarkan hasil observasi rekam medis di BPM Kusmawati kejadian anemia pada ibu hamil masih cukup banyak.

Beberapa upaya telah dilakukan petugas Puskesmas dalam kegiatan promosi kesehatan untuk menurunkan angka kejadian anemia diantaranya dengan melakukan kegiatan yang

meliputi penyuluhan dan konseling tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil, pencegahan anemia, melakukan deteksi dini ibu hamil/nifas penderita anemia dengan pemeriksaan Hb, dan pemberian tablet multivitamin zat besi. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di BPM Kusmawati Tahun 2018.**”

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *observasional analitik*. Berdasarkan waktu pelaksanaannya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross sectional study*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total sampling. Penelitian dilakukan di BPS Kusmawati di kota Surabaya dilaksanakan selama 3 bulan. Peneliti mengajukan permohonan pengambilan data dari LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya kepada pemilik Bidan praktik Mandiri, setelah mendapatkan ijin pengambilan data kemudian melakukan pendekatan dengan ibu dan menjelaskan tentang metode penelitian serta melakukan *inform consent*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu wawancara menggunakan kuesioner dan data sekunder berupa buku register PWS KIA. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara manual dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisa data yang digunakan adalah univariat, bivariate dengan uji statistik menggunakan *Chi-Square*

HASIL PENELITIAN

Hubungan Umur Ibu dengan Kejadian Anemia

Tabel 1 Hubungan antara umur Ibu dengan Kejadian Anemia pada ibu hamil TM III di BPM Kusmawati Surabaya, Tahun 2018

Rusniawati Surabaya Tahun 2018							
UmurIbu	Kejadian Anemia				Total		P
	Anemia		Tidak Anemia				
	N	%	n	%	n	%	
Resiko rendah	18	47	20	53	38	100	0,358
Resiko tinggi	2	29	5	71	7	100	

Tabel 4.2.1 menunjukkan bahwa sebagian besar (53%) berumur 20 – 35 tahun tidak mengalami anemia, sedangkan sebagian besar (712 %) berumur <20 atau > 35 tahun tidak mengalami anemia.

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,358$ ($p > 0,05$) hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara umur dengan kejadian anemia pada ibu hamil

Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia

Tabel 2 Hubungan antara status Gizi dengan Kejadian Anemia pada ibu hamil TM III di BPM Kusmawati Surabaya, Tahun 2018

Status Gizi	Kejadian Anemia				Total		p
	Anemia		Tidak Anemia				
	N	%	n	%	N	%	
Baik	0	0	24	100	24	100	0,000
Kurang	20	95,2	1	4,8	21	100	

Tabel 4.2.2 menunjukkan bahwa seluruh (100%) responden yang memiliki status gizi baik tidak mengalami anemia, sedangkan hampir seluruh (95,2 %) responden yang memiliki status gizi kurang mengalami anemia.

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan adanya hubungan antara status gizi ibu hamil dengan tingkat kejadian anemia.

Hubungan Jumlah Paritas dengan Kejadian Anemia

Tabel 3 Hubungan antara jumlah paritas dengan Kejadian Anemia pada ibu hamil TM III di BPM Kusmawati Surabaya, Tahun 2018

Paritas	Kejadian Anemia				Total		P
	Anemia		Tidak Anemia				
	N	%	N	%	N	%	
Resiko Tinggi	2	25	6	75	8	100	0,222
Resiko Rendah	18	48,6	19	51,4	37	100	

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar (75%) responden yang pernah melahirkan >4 kali tidak mengalami anemia, sedangkan sebagian besar (51,4 %) responden yang melahirkan kurang dari 4 kali tidak mengalami anemia.

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,222$ ($p > 0,05$) hal ini menunjukkan adanya hubungan antara paritas ibu hamil dengan kejadian anemia.

Hubungan Frekuensi antenatal Care (ANC) dengan Kejadian Anemia

Tabel 4 Hubungan antara Frekuensi antenatal Care (ANC) dengan Kejadian Anemia pada ibu hamil TM III di BPM Kusmawati Surabaya, Tahun 2018

Frekuensi ANC	Kejadian Anemia				Total		P
	Anemia		Tidak Anemia		N	%	
	n	%	N	%			
Tidak Rutin	11	92	1	8	12	100	0,000
Rutin	9	27	24	73	33	100	

Tabel 4.2.4 menunjukkan bahwa hampir seluruh (92%) responden yang melakukan pemeriksaan kehamilan <4 kali mengalami anemia, sedangkan sebagian besar (73 %) responden yang melakukan ANC 4 kali atau lebih tidak mengalami anemia.

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan adanya hubungan antara frekuensi ANC dengan kejadian anemia pada ibu hamil

Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan kejadian Anemia

Tabel 5 Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III di BPM Kusmawati Surabaya, Tahun 2018

Tingkat Pengetahuan	Kejadian Anemia				Total		P
	Anemia		Tidak Anemia		N		
	N	%	N	%			
Kurang	10	66,7	5	33,3	15	100	0,034
Cukup	10	33,3	20	66,7	30	100	

Tabel 4.2.5 menunjukkan bahwa sebagian besar (66,7%) responden yang memiliki ti tingkat pengetahuan kurang mengalami anemia, sedangkan sebagian besar (66,7 %) responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup tidak mengalami anemia.

Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,034$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan adanya hubungan antara paritas dengan kejadian anemia pada ibu hamil

Hubungan Kepatuhan Konsumsi Tablet FE dengan Kejadian Anemia

Tabel 6 Hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan Kejadian Anemia pada ibu hamil TM III di BPM Kusmawati Surabaya, Tahun 2018

Konsumsi tablet FE	Kejadian Anemia				Total		P
	Anemia		Tidak Anemia		N	%	
	N	%	N	%			
Patuh	13	36	23	64	36	100	0,024
Tidak patuh	7	78	2	22	9	100	

Tabel 4.2.6 menunjukkan bahwa sebagian besar (64%) responden yang mengkonsumsi tablet Fe sesuai anjuran tidak mengalami anemia, sedangkan hampir seluruh (78 %) responden yang mengkonsumsi tablet Fe tidak sesuai anjuran mengalami anemia.

Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,024$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe pada ibu hamil dengan kejadian anemia

PEMBAHASAN

Hubungan antara umur ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III

Berdasarkan tabel 4.2.1 menunjukkan hasil sebagian besar (53%) berumur 20 – 35 th tidak mengalami anemia, sedangkan sebagian besar (71%) berumur <20 atau > 35 th tidak mengalami anemia.

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,358$ ($p > 0,05$) hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara umur ibu hamil dengan kejadian anemia. Defisiensi zat besi timbul pada saat kebutuhan akan zat besi meningkat, misalnya pada wanita usia reproduktif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Husaini (2014) yang menyatakan bahwa anemia pada ibu hamil dapat terjadi pada semua tingkat umur, pada tingkat umur yang berbeda terdapat variasi kebutuhan zat besi setiap hari, artinya umur ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua tidak akan berpengaruh terhadap kejadian anemia pada ibu hamil.

Hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III

Berdasarkan tabel 4.2.2 menunjukkan bahwa seluruh (100%) responden yang memiliki status gizi baik tidak mengalami anemia, sedangkan hampir seluruh (95,2 %) responden yang memiliki status gizi kurang mengalami anemia. Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan adanya hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian anemia.

Status gizi adalah salah satu faktor penting saat kehamilan, rendahnya status gizi dapat menyebabkan anemia yang mengakibatkan kualitas fisik yang rendah dan berpengaruh pada efisiensi reproduksi. Hal ini di dukung oleh penelitian Marlapan, dkk (2013), ibu hamil sampai proses melahirkan memerlukan zat besi kurang lebih 40 mg/hari atau dua kali lipat kebutuhan dari kondisi tidak hamil, kebutuhan zat besi pada ibu hamil meningkat tetapi konsumsi makanan tidak memenuhi syarat gizi, sehingga ibu hamil akhirnya menderita anemia defisiensi besi

Hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III

Berdasarkan tabel 4.2.3 menunjukkan bahwa sebagian besar (75%) responden yang melahirkan >4 kali tidak mengalami anemia, sedangkan sebagian besar (51,4 %) responden yang melahirkan <4 kali tidak mengalami anemia. Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,222$ hal ini menunjukkan bahwa $p > 0,05$ yang berarti tidak terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian anemia pada ibu hamil, artinya melahirkan lebih atau kurang dari 4 kali tidak memberikan pengaruh terhadap kejadian anemia pada ibu hamil.

Anemia dapat terjadi pada ibu dengan paritas tinggi terkait dengan keadaan biologis ibu dan asupan zat besi dan paritas akan lebih beresiko bila terkait dengan jarak kehamilan yang pendek. Jika kehamilan sebelumnya mengalami anemia dimana cadangan besi di dalam tubuh berkurang maka kehamilan akan menguras persediaan besi di dalam tubuh dan akan menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya. Hal ini didukung oleh penelitian Siti Asyirah (2012) menemukan bahwa jumlah paritas tidak berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Hasil yang sama ditunjukkan juga oleh penelitian yang dilakukan Yuliasuti, dkk (2014) bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas dengan anemia pada ibu hamil.

Hubungan antara frekuensi ANC dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III

Berdasarkan tabel 4.2.4 menunjukkan bahwa hampir seluruh (92%) responden yang melakukan pemeriksaan kehamilan < 4 kali mengalami anemia, sedangkan sebagian besar (73 %) responden yang melakukan pemeriksaan kehamilan 4 kali atau lebih tidak mengalami anemia.

Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan adanya hubungan antara frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan kejadian anemia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin teratur ibu hamil memeriksakan kehamilannya maka semakin kecil pula ibu hamil mengalami anemia.

Semua ibu hamil dianjurkan melakukan pemeriksaan kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II dan 2 kali pada trimester III, hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mendeteksi lebih dini bahaya atau komplikasi yang bisa terjadi dalam kehamilan seperti anemia defisiensi besi pada ibu hamil.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rukiyah (2011) bahwa pentingnya pemeriksaan kehamilan melalui ANC (Antenatal Care) karena pada umumnya kehamilan berjalan normal tetapi dengan bertambahnya usia kehamilan cenderung berkembang menjadi komplikasi yang beresiko.

Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III

Berdasarkan tabel 4.2.5 menunjukkan bahwa sebagian besar (66,7%) responden yang memiliki pengetahuan kurang mengalami anemia, sedangkan sebagian besar (66,7 %) responden yang memiliki pengetahuan cukup tidak mengalami anemia. Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,034$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan adanya hubungan antara paritas dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan ibu hamil tentang anemia dan tablet Fe semakin kecil kemungkinan mengalami anemia dalam kehamilannya.

Pengetahuan ibu hamil yang kurang tentang anemia serta tablet Fe akan mempengaruhi kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi selain itu karena efek samping yang ditimbulkan dari tablet Fe ibu cenderung tidak mau dan tidak tepat dalam mengonsumsi tablet Fe sehingga ibu hamil mengalami anemia. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki ibu maka semakin beragam pula jenis makanan yang dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi.

Menurut Notoatmojo (2012) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang anemia dalam kehamilan antara lain kurangnya informasi dari tenaga kesehatan kepada ibu hamil, kurang jelasnya informasi yang disampaikan dan kurangnya kemampuan ibu hamil untuk memahami informasi yang diberikan.

Hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III

Tabel 4.2.6 menunjukkan hasil sebagian besar (64%) responden yang mengkonsumsi tablet Fe sesuai anjuran tidak mengalami anemia, sedangkan hampir seluruh (78 %) responden yang mengkonsumsi tablet Fe tidak sesuai anjuran mengalami anemia.

Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,024$ ($p < 0,05$) artinya adanya hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe pada ibu hamil dengan kejadian anemia. Sehingga jika ibu hamil patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe angka kejadian anemia pun akan semakin kecil.

Kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet Fe diukur dari ketepatan jumlah tablet Fe yang dikonsumsi, ketepatan cara mengkonsumsi dan frekuensi konsumsi per hari sehingga apabila ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari secara berturut-turut setiap hari selama kehamilan dengan diminum bersama air putih atau vitamin C maka kejadian anemia pada ibu hamil dapat dicegah.

Hal ini sesuai dengan teori Hidayah (2012) bahwa suplemen rutin per oral adalah cara terbaik untuk mencegah anemia defisiensi besi pada kehamilan. Ketidakpatuhan terjadi karena keraguan terhadap pemberian suplemen zat besi, efek samping serta ketidaksadaran ibu hamil bahwa mereka membutuhkan zat besi akibatnya salah satu program pemerintah dalam hal pengawasan dan pencegahan anemia tidak berhasil, karena salah satu faktornya adalah ketidakpatuhan sehingga hal ini memicu angka kejadian anemia pada kehamilan yang masih relatif tinggi.

SIMPULAN

1. Tidak terdapat hubungan umur Ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di BPM Kusmawati.
2. Terdapat hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di BPM Kusmawati.
3. Tidak terdapat hubungan paritas dengan kejadian anemia pada ibu hamil di BPM Kusmawati.
4. Terdapat hubungan Frekuensi Antenatal Care dengan kejadian anemia pada ibu hamil di BPM Kusmawati.
5. Terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di BPM Kusmawati.
6. Terdapat hubungan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di BPM Kusmawati

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin R, Syam m, Rusnah. 2007. *Studi kasus kontrol anemia ibu hamil*. Jurnal Medika Unhas.
- Asyirah, S. 2012. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2012*. Depok: FKM UI

- Boyle, Maureen. 2008). *Kegawatdaruratan dalam persalinan*. Jakarta: kedokteran EGC
- Feryanto, achmad. 2011. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta: salemba medika
- Hidayah, W dan Anasari, T. 2012. *Hubungan Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Fe dengan Kejadian Anemia di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ilmiah Kebidanan. Vol.3 No.2 Edisi Desember 2012.
- Herlina N, Djamilan F. 2006. *Faktor Resiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Bogor*. Jakarta
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas*
- Kemenkes RI. 2013. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Direktorat Bina Gizi Masyarakat.
- Marlapan, S., Wantouw, B. dan Sambeka, J. 2013. *Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Wilaah Kerja Puskesmas Tuminting Kec. Tuminting Kota Manado*. E journal Keperawatan (e-Kp). Volumen 1 Nomor 1. Agustus 2013.
- Manuaba IBG. 2012. *Buku Ajar Patologi Obstetri – untuk mahasiswa Kebidanan*. Jakarta: EGC
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Metedologi penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Proverawati, atikah. 2011. *Anemia Dan Anemia Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2009. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta:BP-SP.
- Rukiyah, Ai Yeyeh dkk. 2009. *Asuhan kebidanan I (Kehamilan)*. Jakarta: trans Info M
- Siswosuharjo, suwignyo & Fitria Chakrawati. 2010. *Panduan super lengkap hamil sehat*. Semarang : PENEBARPlus+
- Sinsin, Iis. 2008. *Masa Kehamilan Dan Persalinan*. Jakarta:PT ELEX Media Komputindo.
- Sulistiyawati, Ari. 2009. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Setiadi. 2013. *Konsep dan penulisan riset keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saifudin, A Bari, dkk. 2007. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohradjo*. Jakarta: Tridasa Printer.
- Tarwoto dan wanidar. 2007. *Anemia pada ibu hamil, konsep dan penatalaksanaanya*. Jakarta: trans Info Media.
- Wiknjosastro. 2010. *Ilmu Kebidanan Edisi 3*. Jakarta: yayasan bina pustaka sarwono Prawiroharjdo.
- Wibisono, hermawan dan dewi ayu bulan febry kurnia. 2009. *Solusi Sehat Seputar Kehmailan*. Bandung:Dzikra.

Yukiastuti, E., Tutiana, A., Syahlani, A. 2014. *Hubungan Pendidikan Dan Paritas Ibu Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil*. Dinamika kesehatan Vol.14 Desember 2014

Zebua, A.M. 2011. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Gizi Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Tuhemberua Kabupaten Nias Utara Tahun 2011*. Medan: Fakultas Kesehatan mAsyarakat Universitas Sumatera Utara.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TM III DI BPM KUSMAWATI SURABAYA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ www.stikespemkabjombang.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%